

Behandlung eines Bienenstichs (Wespenstich)

Bei Panik, Aufregung und Angst

Zuerst **Aconitum nappelus C200**

- Eine **Besserung** tritt ein durch einen **kühlen Umschlag**, eine Verschlimmerung durch Wärme und Berührung
- Die Betroffenen haben eine geschwollene Haut oder **geschwollene** Schleimhäute, die Haut oder die Schleimhäute sind blassrot und **heiß**.
- Die Betroffenen haben stechende, brennende Schmerzen.

ODER Mittel2:

Apis mellifica
In der **C30** oder **C200**
Potenz

Insektenstiche - anaphylaktischer Schock

Die ersten Anzeichen sind meistens ein Brennen auf und unter der Zunge und im Rachenbereich. Hinzu kommen Juckreiz und Hitzegefühl. Diese zeigen sich auch oft an Händen und Füßen. Danach entwickeln sich rasch

- Rötung,
- Juckreiz,
- [Quaddeln](#) und
- Ödeme.



ODER Mittel 3:

Acidum carbolicum
(Carb-ac) **C30/C200**

Der gesamte Kreislauf bricht zusammen.

Diese äußeren Symptome werden begleitet von:

- zunehmenden Angstgefühlen,
- verengten Luftwegen,
- Übelkeit und Erbrechen,
- Krämpfen,
- Blutdruckabfall,
- beschleunigter Herzschlag,
- Schwäche,
- Urin- und Stuhlabgang,
- Bewußtlosigkeit – **Notarzt 112**



Einnahme der homöopathischen Globuli

1. ca. 2 Globuli in einem Glas mit ca. 150 ml Wasser auflösen lassen (ohne Gas).
CAVE: Im AKUTEN Fall die Globuli direkt in den Mund geben!
Im Notfall jetzt einen Notarzt anrufen – 112.
2. Einen großen Schluck einnehmen.
3. Wenn nach kurzer Zeit (Minuten) der Besserung, die alten Beschwerden und Symptome wieder auftreten → erneut einen Schluck einnehmen. Bitte vorher mit einem Löffel stark umrühren (verkleppern).
4. Während einer Besserung keine erneute Gabe!!!!
5. Akute Beschwerden erfordern eine höhere Potenz und evtl. mehrmalige Gaben.
6. Bei einer Besserung bitte keine erneute Gabe – ABWARTEN!
7. Neue Symptome verlangen nach einem Mittelwechsel (siehe Punkt 8).
8. Event. Mittel 1 danach Mittel 2/3 – oder Mittel 3 dann evtl. Mittel 2.
9. 1. Hilfe Maßnahmen nicht vergessen – **Telefon 112.**